

3.5.11. feladat

A FRUSTR.msw adatállományon végrehajtott parciális korrelációs vizsgálat elvégzése után (PULSE_1 és PULSE_2 változók kapcsolatából szűrjük ki a PULSE_0 változó hatását, nemenként meghatározva) válaszoljuk az alábbi kérdésekre:

- Érvényes esetek száma a nők között abban a vizsgálatban, amikor a PULSE_1 és PULSE_2 változók közötti kapcsolatból kiszűrjük a PULSE_0 változó hatását:
- Érvényes esetek száma a férfiak között abban a vizsgálatban, amikor a PULSE_1 és PULSE_2 változók közötti kapcsolatból kiszűrjük a PULSE_0 változó hatását:
- A PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti parciális korrelációs együtttható értéke a férfiak között, ha a PULSE_0 változó hatását kiszűrjük:
- A PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti parciális korrelációs együtttható értéke a nők között, ha a PULSE_0 változó hatását kiszűrjük:
- A PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti parciális korrelációs együtttható értéke a férfiak között, ha a PULSE_0 változó hatását kiszűrjük különbözik 0-tól 95%-os megbízhatósági szint mellett?
- A PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti parciális korrelációs együtttható értéke a férfiak között, ha a PULSE_0 változó hatását kiszűrjük különbözik 0-tól 99%-os megbízhatósági szint mellett?
- A PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti parciális korrelációs együtttható értéke a nők között, ha a PULSE_0 változó hatását kiszűrjük különbözik 0-tól 95%-os megbízhatósági szint mellett?
- A PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti parciális korrelációs együtttható értéke a nők között, ha a PULSE_0 változó hatását kiszűrjük különbözik 0-tól 90%-os megbízhatósági szint mellett?