

3.5.14. feladat

A FRUSTR.msw adatállományon végrehajtott elemzés után válaszoljunk az alábbi kérdésekre:

- A férfiak között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Kendall-féle tau rangkorrelációs együttható értéke:
- A nők között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Kendall-féle tau rangkorrelációs együttható értéke:
- A férfiak között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Kendall-féle tau rangkorrelációs együttható szignifikánsan különbözik 0-tól 95%-os megbízhatósági szint mellett?
- A férfiak között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Kendall-féle tau rangkorrelációs együttható szignifikánsan különbözik 0-tól 99%-os megbízhatósági szint mellett?
- A férfiak között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Spearman-féle rangkorrelációs együttható értéke:
- A nők között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Spearman-féle rangkorrelációs együttható értéke:
- A nők között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Spearman-féle rangkorrelációs együttható szignifikánsan különbözik 0-tól 95%-os megbízhatósági szint mellett?
- A nők között a PULSE_1 és PULSE_2 változó közötti Spearman-féle rangkorrelációs együttható szignifikánsan különbözik 0-tól 99%-os megbízhatósági szint mellett?
- A Spearman-féle rangkorrelációk a férfiak és nők között 95%-os szinten szignifikánsan különböznek egymástól?