

3.5.3. feladat

A Szondim.msw adatállományon végrehajtott vizsgálat alapján válaszoljunk az alábbi kérdésekre:

- A sadist1 és hyst1 változók közötti Pearson-féle korrelációs együttható értéke:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Wilcox-féle korrelációs együttható értéke:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Pearson-féle korrelációs együttható p-értéke:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Wilcox-féle korrelációs együttható p-értéke:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Pearson-féle korrelációs együtthatójának 95%-os konfidencia-intervallumának alsó határa:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Wilcox-féle korrelációs együtthatójának 95%-os konfidencia-intervallumának alsó határa:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Pearson-féle korrelációs együtthatójának 95%-os konfidencia-intervallumának felső határa:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Wilcox-féle korrelációs együtthatójának 95%-os konfidencia-intervallumának felső határa:
- A sadist1 és hyst1 változók közötti Pearson-féle korrelációs együtthatója 95%-os szinten különbözik 0-tól?